UNA NUEVA SUBESPECIE DE TODIROSTRUM LATIROSTRE DE LA COMISARIA DEL VAUPES (COLOMBIA)

POR

ANTONIO OLIVARES, O.F.M.
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia.

Todirostrum latirostre mituense subsp. nova.

Todirostrum latirostre caniceps (non Chapman) Olivares, 1955: 273 (Santa Cruz de Waracapurí, localidad de la margen izquierda del río Vaupés, a unos 19 kms. en línea recta de la población de Mitú).

TIPO: Un macho adulto de Mitú, Vaupés (Colombia), alt. 240 m., Nº 4699, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Coleccionado el 16 de agosto, 1960, por Antonio Olivares, O.F.M., Nº original 3269.

PARATIPO: Un macho adulto de Mitú, Vaupés, alt. 240 m., Nº 10049, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Coleccionado el 25 de mayo de 1961 por José Ignacio Borrero, Nº original 4169.

DIAGNOSIS: Similar a *T. l. caniceps* (Chapman), 1924, del sureste de Colombia (Caquetá y Putumayo), oriente de Ecuador, región central del Perú y occidental del Brasil, pero difiere por su menor tamaño y presentar la coronilla más oscura y de un gris más puro, la espalda también más oscura, regiones perioculares y auriculares más opacas, menos antecinas.

DISTRIBUCIÓN: Conocida solamente de la región de Mitú, Vaupés.

DESCRIPCIÓN DEL TIPO: Parte superior de la cabeza gris *(Chaetura Drab* de Ridgway, 1912) con el centro de las plumas negruzco *(Chaetura Black)*; lores y región periocular ocráceos *(Ochraceous-Tawny)*, de este color está teñida la base de la frente en una franja angosta que se hace más oscura, *Snuff Brown;* auriculares grisáceas *(Light Brownish Olive)*; espalda, escapulares, rabadilla y coberteras supracaudales, verde amarillento *(Yellowish Oil Green)*. Alas negruzcas *(Fuscous)* con el vexilo externo de las rémiges marginado de oliváceo amarillento *(Olive-Yellow)*, el vexilo interno de las primarias internas, de las secundarias y de las terciarias bordeado lateralmente de blanco amarillento *(Marguerite Yellow)*; partes expuestas de las coberteras alares menores y borde ancho apical de las medianas, amarillento *(Sulphine Yellow)*, la región basal de estas últimas plumas, en gran parte expuesta, es negra *(Black)*; coberteras mayores negras *(Chaetura Black)* con el borde externo amarillento *(Old Gold)*; borde del ala y coberteras infra-alares, amarillo *(Amber Yellow)* que se aclara hacia la axila hasta convertirse también en ésta en *Primrose Yellow.* Cola negruzca *(Chaetura Drab)* con los vexilos externos de las rectrices, amarillo verdoso *(Pyrite Yellow)* y con un borde apical angosto que se nota más por debajo del ápice, grisáceo claro *(Drab)*, también se aprecia una mancha subapical negra *(Blackish Mouse Gray)* más notable en las rectrices externas. Mejillas y garganta, blanco sucio amarillento *(Pale Ochraceous-Salmon)*. Pecho grisáceo *(Light Grayish Olive)* con los lados oliváceos *(Light Yellowish Olive)*; abdomen y coberteras infracaudales blanquecinos *(Ivory Yellow)*; flancos oliváceos *(Olive-Yellow)*; tibias, moreno oliváceo *(Saccardo's Olive)* pero la parte basal de aquéllas antecina *(Buffy Citrine)*. "Iris café, pico negro con la punta blanquecina, patas, cuerno gris azuloso, uñas grises (Olivares *in sched)*. Ala (cuerda) 45.7, (aplanada) 46; cola, 32; culmen expuesto, 11.5, desde la base, 15, anchura enfrente de las narinas, 5; tarso, 18.6; dedo medio con uña, 12 mm. Olivares *in sched.:* "Longitud total 100; envergadura 145 mm.".

OBSERVACIONES: Según las dimensiones del tipo [ala (cuerda) 45.7, (aplanada) 46; cola, 32; culmen expuesto, 11.5 mm.] esta nueva subespecie es más pequeña que *caniceps* de la cual Cory y Hellmayr (1927: 305) anotan: "wing (male) 51-52; tail 33-37; bill 12". El parátipo, ala (cuerda) 45.6 (aplanada) 46; cola, 32; culmen expuesto, 12, desde la base 15, anchura enfrente de las narinas, 5; tarso, 18.5; dedo medio con uña, 13 mm.

En coloración el parátipo difiere del tipo en llevar aquél la garganta teñida de grisáceo *(Light Grayish Olive)*.

La especie en sus varias subespecies ha sido registrada así: *latirostre* del interior del Brasil, oriente de Bolivia y sureste del Perú; *caniceps*, de la zona tropical del Caquetá y Putumayo (Florencia; Umbría) en Colombia (*cf.* de Schauensee, 1950: 845). Zimmer (1940: 8-9) describió la subespecie *mixtum* y le asignó como área de distribución la región central y sureste del Perú y el norte de Bolivia en las zonas tropicales de La Paz y Cochabamba.

BIBLIOGRAFIA CITADA

CHAPMAN, FRANK M.
1924 "Descriptions of New Flycatchers from Colombia, Ecuador and Peru". Amer. Mus. Nov., 118. Pp. 1-10.

CORY, CHARLES B. y CHARLES E. HELLMAYR.
1927 "Catalogue of Birds of the Americas and the Adjacent Islands in Field Museum of Natural History... Part V, Tyrannidae". Field Mus. of Nat. Hist. Publ. 242, zool. ser. *13*. Pp. i-vi, 1-518.

DE SCHAUENSEE, RODOLPHE MEYER.
1950 "The Birds of the Republic of Colombia". (Tercera entrega: Dendrocolaptidae - Tyrannidae). Caldasia, *5* (24): 645-872.

OLIVARES, ANTONIO, O.F.M.
1955 "Algunas aves de la Comisaría del Vaupés (Colombia)". Caldasia, *7* (33): 259-275.

ZIMMER, JOHN TODD.
1940 "Studies of Peruvian Birds. Nº XXXIV. The genera *Todirostrum*... and *Hemitriccus*". Amer. Mus. Nov., 1066. Pp. 1-24.